Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 29 de març de 2016
Avís 12/2016

Cultius:
Ametller, avellaner i noguer, olivera, presseguer i nectarina i horta

Avís: Recordeu que en noves plantacions de fruiters i vinya cal adquirir material vegetal amb passaport fitosanitari, i des d'aquest any 2016 amb la modificació de la Decisió de *Xylella fastidiosa* també es necessita passaport per olivera

Ametller:

Varietats en postfloració: pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

Avellaner

Bacteriosis

Només en aquelles finques on hi hagut problemes d'aquesta malaltia en anys anteriors, es recomana protegir a la brostada amb compostos cúprics. **Recordeu que en aquest cultiu no hi ha altres bactericida autoritzats**

Avellaner i noguer:

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Olivera:

Repilo o Ull de Gall

Durant la primavera, especialment en temps humit i plujós, cal protegir els arbres contra aquesta malaltia. Especialment si la presència d'inòcul és important.

Les mesures culturals, com la poda que afavoreixi la ventilació de la copa dels arbres o els adobats nitrogenats equilibrats, contribueixen a disminuir la incidència del fong.

Corc (*Hylesinus toranio*)

A les finques on s'observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona del Baix Camp, és important aprofitar l'esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per davant de la part afectada.

Presseguer i nectarina:

Arrufat

Les condicions climàtiques actuals són favorables pel desenvolupament de la malaltia. Es recomana mantenir protegides les plantacions, especialment les que normalment es veuen afectades o amb presència de malaltia.

Varietats en floració: Monilia

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració.

Varietats en post floració:

Trips: Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals

Pugó verd: Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades

Horta:

Patata

Es recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
http://www.gencat.cat/daam
ssv.t.daam@gencat.cat