



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 8 de març de 2012



Cultius:

Avellaner , Ametller , Presseguer i nectarina i Horta

Avellaner

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues

Ametller

Prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar un tractament des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Floració: monilia

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració.

Presseguer i nectarina

Arrufat i cribat

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties

Pugó i poll de San Jose

A les plantacions on les varietats es trobin amb botó rosa, es poden iniciar els tractaments per protegir-les contra el pugó, i contra el poll de San Jose en aquelles finques afectades.

Horta

CARXOFERA

Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR

Pugó i Erugues

Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.