



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 16 d' abril de 2012



**Cultius:**

**Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Presseguer i nectarina i Horta**

### Vinya

#### **Corc del raïm**

A les finques on es realitzi la confusió sexual, ja es poden penjar els difusors.

#### **Cendrosa**

En les zones i varietats més primerenques ja s'ha iniciat la brotació.

Recordem la importància que té fer el primer tractament, que s'ha de realitzar quan la brotada té uns 10-12 cm de longitud.

### Olivera

#### **Repilo o "Ull de gall"**

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant de les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat ambiental cal realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

### Noguer

#### **Bacteriosi**

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia:

-El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'obertura de borrons.

## Avellaner

### Badoc

Només a les finques on hi hagi més d'un 15% de borrons afectats per badoc, es recomana realitzar un tractament a l'estadi de 3-6 fulles.

## Presseguer i nectarina

### Floració: Monila

Les darreres pluges i temperatura són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, en les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració .

### Post-floració:

#### Trips

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.

#### Cendrosa

A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d'un centímetre de diàmetre, i fins a l'enduriment del pinyol.

## Horta

### ENCIAM

#### Pugó

Cal vigilar les plantacions i quan s'observin els primers atacs, tracteu per tal d'evitar la seva proliferació

### CEBA

#### Míldiu

Per tal d'evitar la proliferació d'aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.

### TOMÀQUET

#### *Tuta absoluta*

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

## Altres

**Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii*** que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.