



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 18 d'agost de 2014
Avís 67/2014

Cultius:
Vinya, olivera, avellaner, fruiters i horta.

Vinya:

Cuc del Raïm: Tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

- **Baix Penedès i Camp de Tarragona i DOQ Priorat:** Ja vam donar l'avís
- **Priorat DO Montsant:**
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, la màxima eclosió és dissabte 16, diumenge 17 i dilluns 18.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà, l'inici de l'eclosió és divendres 15 i dissabte 16. La màxima eclosió és dilluns 18, dimarts 19 i dimecres 20.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga l'inici de l'eclosió és dimarts 19 i dimecres 20.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarra, Vimbodí i Rocafort estem en període de posta.

Avís sobre l'aplicació de productes fungicides

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, dins dels 21 dies abans de la verema no s'aconsella fer tractaments amb productes fungicides.

Olivera:

Mosca de l'oliva. *Bactrocera oleae*

De moment no recomanem cap nou tractament. Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades.

Fruiters

Mosca de la fruita o Ceratitis

Les poblacions són molt elevades, cal estar molt atents i anar protegint els fruits.

Horta:

Tomàquet

Tuta absoluta

Generalment a l'agost augmenten les poblacions, cal estar atents i protegir el cultiu. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els insectes depredadors. Recordem que per tal d'evitar l'aparició de resistències és molt important seguir les especificacions que posa l'etiqueta dels productes, incloent el número màxim d'aplicacions per campanya.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant, els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareix aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat

[@eatarragonacat](#)