



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 17 de juliol de 2015
Avís 50/2015

Cultius:

Vinya, olivera, avellaner, noguer, fruiters de pinyol i horta

Vinya:

Cuc del Raïm: Tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

• **Baix Penedès:**

– **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell estem en període de posta.

– **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albiniana, Bellvei i Banyeres s'ha iniciat la posta.

• **Camp de Tarragona:**

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils, estem en període de posta d'ous.

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls s'ha iniciat la posta.

– **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorenç, s'ha iniciat el vol.

• **Priorat DO Montsant:**

– **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, del Masroig i del Molar estem en el període de posta dels ous.

– **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almos, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella s'ha iniciat la posta

• **DOQ Priorat:**

A les zones primerenques Bellmunt, Lloar i El Molar, s'ha iniciat el vol

Cendrosa

Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles.

Olivera:

Mosca de la oliva. *Bractocera oleae*

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

Avellaner:

Borró sec

A les finques afectades es recomana realitzar el tractament contra aquesta malaltia a partir del dia 13 fins el dia 20.

Aranya

Estiguen atents a l'aparició dels primers símptomes i tracteu si és necessari. S'estan trobant finques afectades.

Noguer:

Carpocapsa

Estem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Aranya

Vigileu les plantacions i esteu atents a l'aparició dels primers símptomes.

Fruiters de pinyol:

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Monilia

Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Cendrosa en fulla

Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

Grafolita

Recordeu que el llindar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringiensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures s'està observant aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Mongeta

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat