



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 27 d' abril de 2012



Cultius:

Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Ametller, presseguer i nectarina i

Horta

Vinya

Cendrosa

Recordem la importància del tractaments preventius, el primer dels quals s'ha de realitzar quan la brotada té uns 10-12 cm de longitud.

Olivera

Repilo o "Ull de gall"

Cal estar atents a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles, i elevada humitat ambiental i realitzar un tractament per a la protecció de fulles noves.

Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia

Noguer

Carpocapsa

Ja s'han iniciat les primeres captures d'adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja s'han d'haver instal·lat els difusors.

Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia:

- El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'obertura de borrons.
- El segon tractament es realitza a l'inci de la floració femenina.

Antracnosi

Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics.

Avellaner

Pugó

Cal anar observant el revers de les fulles, i si es detecten colònies de pugó tracteu si és necessari.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Ametller, presseguer i nectarina

Cribat i arrufat:

Degut a la climatologia actual, a les finques afectades, cal renovar la protecció.

Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions.

Presseguer i nectarina

Post-floració:

Trips

Només caldrà tractar el trips a caiguda de pètals, si es preveu atac fort, i en varietats sensibles.

Cendrosa

A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d'un centímetre de diàmetre, i fins a l'enduriment del pinyol.

Poll blanc del presseguer:

En les prospeccions que hem realitzat, s'ha detectat un alt nivell de parasitisme. Per tant, el tractament contra les larves de la primera generació només s'aconsella en parcel·les que es detectin les típiques acumulacions vermelles de larves a les branques. Ja es pot fer el tractament de fer de forma localitzada i exclusivament als arbres afectats.

Horta

ENCIAM

Pugó

Cal vigilar les plantacions i quan s'observin els primers atacs, tracteu per tal d'evitar la seva proliferació

CEBA I PATATA

Míldiu

Per tal d'evitar la proliferació d'aquesta malaltia cal fer els tractaments oportuns.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

PATATA

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.