




Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 24 d'agost de 2012



Cultius:

Vinya, Olivera, Noguer, Fruïters, Presseguer i Horta

Vinya

Avis sobre l'aplicació de productes fungicides

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, dins dels 21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb productes fungicides.

Olivera

Mosca de l'olivera: *Bractocera oleae*

En els darrers controls l'índex d'olives picades és segueix mantenint baix, de manera general no cal tornar a protegir. Tot i això, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades.

Noguer

Carpocapsa

Recordeu que cal continuar tenint el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Fruïters:

Mosca de la fruita: *Ceratits*

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

Presseguer:

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Cal realitzar controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* (PAE*), respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

BAJOCA

Aranya

Vigileu l'aparició dels primers focus per evitar la seva proliferació.

Erugues

Esteu atents a l'aparició de les primeres erugues, per al seu control.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a prunes, préssec i vinya.

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.

*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica