Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 05 de febrer de 2016
Avís 5/2016

Cultius:
Vinya, ametller, avellaner i noguer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Vinya

Malalties de fusta

Durant la poda, les ferides produïdes a la vinya, són els llocs per on penetren els fongs que causaran posteriorment les malalties de la fusta. Com que actualment no hi ha mètodes ni productes curatius, són d'especial importància les següents mesures preventives:

- De manera general, cal realitzar la poda aviat
- Deixar pel final la poda dels ceps que estan afectats o se sospita que poden estar-ho i desinfectar l'eina utilitzada
- Fer una poda racional, minimitzant al màxim la realització de ferides grosses.
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Evitar realitzar la poda en períodes plujosos o força humits.
- Aplicar algun protector sobre les ferides de poda, especialment si són grans.

Ametller

Esteu atents a l'evolució fenològica de les diferents varietats, s'està avançant respecte a anys anteriors degut a les condicions climatològiques actuals.

Varietats en prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Varietats en floració: monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure

fàcilment les galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Presseguer i nectarina

Varietats en prefloració: arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Nota: Cal assegurar-se que els productes utilitzats estan autoritzats en prefloració, ja que cal recordar que s'han produït modificacions en les autoritzacions d'algunes matèries actives.

Horta:

Ceba, i Calçot

Mildiu i stemphilium

Recordeu que les humitats elevades i persistents afavoreixen aquestes malalties. Vigileu les plantacions per tal de realitzar-ne el control.

Carxofa

Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Continua l'eclosió dels ous, per tant, cal seguir controlant la població d'aquestes erugues abans de que penetrin als nervis de les fulles o a les tiges.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Recordeu que durant els mesos de desembre, gener i febrer és el moment de realitzar la poda de les palmeres.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d'interès:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
http://www.gencat.cat/daam
ssv.t.daam@gencat.cat