




Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 20 de juliol de 2012



Cultius:

Vinya, Olivera, Noguer, Avellaner, Fruïters, Presseguer i Horta

Vinya

Cuc del raïm: Tercera generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres s'ha iniciat el vol.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils estem en període de posta.
- **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Vall s'ha iniciat la posta.
- **A les zones tardanes** s'ha iniciat el vol.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets i d'El Masroig, l'inici d'eclosió dels ous serà el dilluns dia 23 i el dimarts dia 24.
- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella el període de posta es donarà a partir de diumenge dia 22.
- **A les zones tardanes** encara no s'ha iniciat el vol.

-Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar s'ha iniciat el vol.
- **A les zones mitjanes i tardanes encara no** s'ha iniciat el vol.

-Conca de Barberà: encara no s'ha iniciat el vol.

Míldiu

Cal estar atents per si apareixen taques en algun indret

Cendrosa

En les varietats tardanes i sensibles a aquesta malaltia pot fer-se un quart tractament a l'inici del canvi de color.

Podridura grisa o Botrytis

El tercer tractament es fa just a l'inici del verolat.

Olivera

Mosca de l'olivera. *Bractocera oleae*

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en la varietat arbequina.

Malgrat tot s'està detectant en finques concretes d'algunes zones com Salomó, així com en varietats primerenques com sevillenca, grossal, morruda etc. un índex de picada superior al 5%, per això cal fer un recompte de picades i realitzar un tractament si es supera el llindar.

En agricultura ecològica, si s'utilitza captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a mitjans d'aquest mes.

Noguer

Carpocapsa

Ens trobem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Avellaner

Borró sec

A les finques afectades es recomana realitzar el tractament contra aquesta malaltia a partir del dia 14 fins el dia 21.

Aranya

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

Fruiters:

Mosca de la fruita: *Ceratits*

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal estar atents des de l'inici del canvi de color per tal de protegir el període de maduració de les diferents varietats.

Presseguer:

Aranya

Recomanem vigilar les plantacions i tractar si es supera el llindar de tolerància, recordeu que aquest té en compte la presència de fauna auxiliar.

Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

En algunes finques s'ha vist un increment de les poblacions, per tant, és molt important realitzar controls individualitzats ja que els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que són molt importants per mantenir els nivells de tuta baixos.

Podeu consultar els productes autoritzats i les seves restriccions al full informatiu del DAAM i als avisos fitosanitaris que estan penjats a la web del departament. Recordeu que la utilització dels productes de forma inadequada afavoreix l'aparició de resistències.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

En les condicions actuals de baixa humitat relativa i calor poden aparèixer atacs d'aquest àcar. Cal localitzar les primeres taques de color bronzejat a la part baixa i tractar localment. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

MONGETA

Aranya

Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.