



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 18 de juny de 2015
Avís 34/2015

Cultius:

Vinya, avellaner, ametller, fruiters, cirerer i horta

Calamarsa

A la zona del Priorat del Lloar, Gratallops, Torroja i en determinats llocs del Baix camp i Tarragonès, aquesta darrera tarda i nit s'han produït calamarses. En els llocs afectats amb ferides als raïms i sarments, es recomana fer un tractament tan aviat com es pugui entrar a les finques, amb barreges de compostos cúprics i Folpet. En aquests llocs, on la pluja hagi estat superior als 10 litres, és convenient utilitzar la barreja de compostos cúprics i Folpet amb un producte sistèmic pel mildiu.

Els cultius d'olivera i avellaner que han pogut quedar afectats, es pot realitzar un tractament amb compostos cúprics.

Vinya

Míldiu

Després de les darreres pluges, que han estat en general importants, aconsellem fer un tractament a totes les comarques abans del dilluns dia 22. Pot fer-se amb el del cuc del raïm, però mullant alhora els raïms i tota la vegetació el millor possible.

Recordem que solament queda localitzar taques a la Conca de Barberà i en el cas de trobar-ne, cal trucar al tècnic de l'ADV o a aquest Servei.

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

• Baix Penedès:

– **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell la màxima eclosió dels ous serà de dimarts 16 a dijous 18.

– **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres la màxima eclosió serà dissabte 20, diumenge 21 i dilluns 22 .

• Camp de Tarragona:

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils la màxima eclosió serà dijous 18, divendres 19 i dissabte 20.

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls la màxima eclosió serà divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21.

– **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorenç, l'inici de l'eclosió és dissabte 20 i diumenge 21.

- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, del Masroig i del Molar la màxima eclosió serà dijous 18, divendres 19 i dissabte 20.
 - **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, del Molar, La Serra d'Almos, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella l'inici de l'eclosió es dijous 18 i divendres 19.
 - **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal estem en període de posta.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins s'ha iniciat la posta.
- **DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar l'inici de l'eclosió es dijous 18 i divendres 19.
 - **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, estem en el període de posta dels ous.
 - **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera estem en el període de posta dels ous.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà s'ha iniciat la posta dels ous
 - **A les zones mitjanes** com Blanafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga s'ha iniciat el vol.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s'haurà de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa

Recordem que el primer tractament preventiu s'ha de fer al final de la floració, a la caiguda dels capitells florals.

Avellaner

Diabló

Zones de muntanya: Ja es va donar l'avís del primer tractament contra la picada alimentària.

Part baixa del camp de Tarragona: A partir del dia 17 ja es pot realitzar el segon tractament contra la picada de posta, però cal tenir en compte que els nivells de població que estem detectant en els punts de control són baixos. Tracteu només si detecteu presència d'adults.

Zeuzera

En aquelles finques afectades que no es realitzi la confusió sexual es recomana fer el primer dels 2 tractaments entre dimecres 17 i dimarts 23.

Aranya

Esteu atents als primers símptomes.

Ametller:

Brot sec o Fusicocum

Recordem que també durant el mes de juny si es produeixen mullenes cal protegir aquelles varietats sensibles

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Cirerer

Drosophila suzukii

Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que s'observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera, i també retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra.

Aviseu a aquest Servei si es detecten danys.

[Full informatiu](#)

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat