



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 30 de juny de 2015
Avís 41/2015

Cultius:

Vinya, avellaner, noguer, fruiters, fruiters de pinyol i horta

Vinya

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocida.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocida, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

- **Baix Penedès i Camp de Tarragona:** ja es va donar l'avís.
- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques, mitjanes i tardanes:** ja es va donar l'avís.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins la màxima eclosió és dimecres 1, dijous 2 i divendres 3.
- **DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques i mitjanes** ja es va donar l'avís.
 - **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de Falset limítrof amb Porrera la màxima eclosió és dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 1 de juliol.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà ja es va donar l'avís.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga la màxima eclosió és dimarts 30, dimecres 1 i dijous 2 de juliol.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort l'inici de l'eclosió és dimarts 30 i dimecres 1 de juliol.

Cendrosa

Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles.

Avellaner

Diabló

Zones de muntanya: Esteu atents al contestador per a l'avís de tractament contra la picada de posta.

Aranya

Esteu atents als primers símptomes.

Noguer

Carpocapsa

Esteu atents al contestador per l'avís de segona generació.

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Fruiters de pinyol

Monilia

Les condicions d'alta humitat relativa són molt favorables per la propagació d'aquesta malaltia, cal extremar la vigilància a les finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Cendrosa en fulla

Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

ssv.t.daam@gencat.cat