



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 22 de maig de 2012



Cultius:

Vinya, Noguer, Ametller, presseguer i nectarina i Horta

Vinya

Mildiu

Les pluges del darrer cap de setmana han estat importants a les comarques de l'Alt Camp i Tarragonès, entre 20 i 40 litres, per tant es aconsellable fer un tractament general de protecció des del divendres fins el diumenge. Al Baix Penedès han estat entre 10 i 30 litres, en aquesta comarca ja havíem aconsellat tractar durant la passada setmana abans de les pluges, així que de moment ho considerem protegit. Malgrat tot, si algú no ho va fer llavors cal que protegeixi entre divendres i diumenge.

A les comarques del Priorat i Conca de Barberà les pluges han estat de baixa quantitat, per tant no cal fer tractament general per ara. Malgrat tot cal estar atents i avisar immediatament a les ADV o a aquest servei si es troben taques.

Agricultura ecològica: En les parcel·les de producció ecològica, on solament es poden utilitzar productes preventius a base de coure, si cal iniciar la protecció dels ceps.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius, el segon dels quals s'ha de realitzar a l'inici de la brotada si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols.

Noguer

Carpocapsa

Ja ens trobem en primera generació, per tan cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

Bacteriosi

Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia: Recordem que el tercer tractament es realitza quallat del fruit

Antracnosi

Cal realitzar el segon tractament al quallat del fruit i el tercer 15 dies més tard amb fungicides orgànics.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Les condicions meteorològiques actuals són favorables per aquesta malaltia. Recordem la importància de protegir els arbres especialment a la zona litoral i a les finques amb problemes

Presseguer i nectarina

Post-floració:

Cendrosa

A les varietats molt sensibles, cal iniciar la protecció del fruit a partir d'un centímetre de diàmetre, i fins a l'enduriment del pinyol.

Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les plantacions

Horta

ENCIAM i CARXOFA

Pugó

Cal vigilar les plantacions i quan s'observin els primers atacs, tracteu per tal d'evitar la seva proliferació.

CEBA I PATATA

Míldiu

Les humitats persistents i l'augment de temperatures diürnes afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

PATATA

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga. De moment no s'han detectat danys a la demarcació