



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avís del dia:** 1 de març de 2012



**Cultius:**

**Avellaner , Ametller , Presseguer i nectarina , Vinya i Horta**

### Avellaner

#### **Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)**

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives sobre les quals es pot actuar mitjançant filferros, molles o xeringues

### Ametller

#### **Prefloració: arrufat, cribat i brot sec**

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació de brot sec, arrufat o cribat, cal realitzar un tractament des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

#### **Floració: monilia**

A les zones on es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a l'inici de la floració.

### Presseguer i nectarina

#### **Arrufat i cribat**

A mesura que les varietats comencin a inflar els borrons, cal fer un tractament amb fungicides cúprics per evitar aquestes malalties

#### **Pugó i poll de San Jose**

A les plantacions on les varietats es trobin amb botó rosa, es poden iniciar els tractaments per protegir-les contra el pugó, i contra el poll de San Jose en aquelles finques afectades.

## Vinya

De cara a disminuir al màxim la incidència de les malalties de fusta com l'esca o llampat i l'eutipiosi, cal tenir present:

- Fer una esporga racional, evitant les grans amputacions.
- En cas de ser necessari fer talls de certa amplada, cal tractar directament sobre les ferides amb productes que ofereixin protecció física.
- No deixar les restes de poda al camp. En el cas d'utilitzar picadora, la destrucció ha de ser a la mida més petita possible.
- S'hauran de cremar o bé retirar-les i tancar-les en magatzems

## Horta

### CARXOFERA

#### Cuc de la carxofa (*Gorthyna xanthenes*)

Cal seguir controlant les larves d'aquest barrinador, per tal d'evitar que penetrin a l'interior de les fulles, ja que, una vegada a dins, els tractaments no són eficaços.

### PATATA

És recomanable utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors

### ENCIAM, ESCAROLA, COL I COL-I-FLOR

#### Pugó i Erugues

Es recomana vigilar les plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes.

### ENCIAM, CEBA I CALÇOT

#### Míldiu

Les altes humitats de matinada i les temperatures suaus durant el dia afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia, cal protegir les plantes per possibles atacs.